

M34

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПИСКА ПТИЦЪ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ.

(Область Ильменя).

А. Е. Петрова.

Взгляните на подробную карту Ильменя: масса свѣтлыхъ пятенъ воды усѣяла весь его восточный берегъ почти отъ истока Волхова и до устья Ловати; они опредѣленно ограничены береговыми линіями и такъ перепутались между собой цѣлымъ рядомъ рѣчекъ и притоковъ, что въ нихъ и на картѣ не легко разобратъся, не говоря уже о томъ, что эта мѣстность кажется лабиринтомъ, когда съ нею приходится знакомиться въ дѣйствительности, встрѣчаясь все съ одними и тѣми-же глинистыми берегами, то обрамленными ивнякомъ и усѣянными корчами, то поросшими высокой травой, которая оставила незанятой лишь узкую полосу прибоа; то, наконецъ, довольно высокими, усѣянными гнѣздами береговыхъ ласточекъ и обнаженными (въ низкую воду) рачьими и налимыми норами... Все тѣ же «носы», т. е. клинообразныя отмели при крутыхъ поворотахъ рѣчекъ, съ подмытымъ противоположнымъ берегомъ; все тѣ же расплывчатая устья при впаденіи въ Ильмень. А эти озерки, которыя такъ рѣзко выступаютъ на картѣ, оказываются безбрежными пространствами, сплошь заросшими камышемъ и всѣми, возможными въ данной широтѣ, водными растеніями. Иногда они покрыты лоскутами свѣтлой воды—это болѣе глубокия мѣста. Грести на челнѣ въ этихъ огромныхъ лужахъ не дастъ камышъ, «пихаться», благодаря илистому дну, трудно; ходить—еще того труднѣе. Берегъ, скрытый густой растительностью, издали различить невозможно, и иногда ему



предшествуетъ болото. Между протоками, соединяющими озерки, очень многіе имѣютъ высокіе берега, настолько поросшіе ивнякомъ, что онѣ образуетъ надъ ними сводъ. Здѣсь рыба, особенно щучки, дерится охотнѣе, и потому ихъ нерѣдко преграждаютъ заколами.

Вотъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, характеръ побережья, гдѣ собранъ предлагаемый орнитологическій матеріалъ. Оно представляетъ приозерныя части Новгородскаго, Крестецкаго и Старорусскаго (до Ловати) уѣздовъ. Чѣмъ далѣе будемъ двигаться отъ береговой линіи Ильменя на востокъ, тѣмъ мѣстность становится болѣе лѣсистой и частью возвышенной, каковы—Бѣлая Гора, Мшашка, Саввинскій лѣсъ и пр., гдѣ добыты многіе виды, и потому списокъ не имѣетъ смысла списка *типа* мѣстности (въ данномъ случаѣ приозерной полосы), но онъ можетъ послужить для него матеріаломъ; приведенныя указанія, гдѣ добытъ каждый экземпляръ, даютъ возможность отдѣлить лѣсныхъ обитателей отъ прочихъ, насколько это возможно по существу дѣла.

Изъ 169 видовъ предлагаемаго перечня 93 добыты въ теченіи трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 1882 года, остальные внесены частью изъ коллекціи г. Геллерта, коллектирующаго также въ области Ильменя, частью на основаніи моихъ прежнихъ наблюденій за періодъ отъ 1875—1879 г. Въ списокъ внесены только тѣ виды, нахожденіе которыхъ лежало внѣ всякихъ сомнѣній, т. е. имѣлись шкурки или птица бывала въ рукахъ. Единичныя появленія безъ того, чтобы былъ добытъ экземпляръ, факты, передаваемые устно и потомъ наблюденіемъ неподтвердившіеся, тѣмъ болѣе ходячіе среди охотниковъ рассказы о залетѣ той или другой птицы, по предлагаемому описанію которой трудно было остановиться на чемъ либо опредѣленномъ, — все это оставлено въ сторонѣ.

Жаркое, сухое лѣто 1882 г. не мало затруднило коллектированіе. Рѣчки, озерки, протоки, какъ и самъ Ильмень, мелѣли и мелѣли съ каждымъ днемъ, до крайности затрудняя разъѣзды на челнѣ даже такихъ размѣровъ, что онѣ едва принималъ троихъ; другой же родъ охоты въ избранной мѣстности, какъ не въ лодкѣ, почти невозможенъ. Мѣстные старо-



жины не запомнятъ за 15—20 лѣтъ такого низкаго уровня Волхова и Ильменя; у Колмова (вовсе не узкое мѣсто) рѣку можно было перейти къ концу лѣта въ бродъ. Много заливовъ по самому озеру и озеркамъ оказались отрѣзанными отъ общей системы водъ, такъ какъ мелкія мѣста обнажились и рыба оказалась пойманной въ болѣе глубокихъ, гдѣ, полусонная, становилась легкой добычей голенастыхъ, да утокъ рыбалокъ... Появление *Ardea minuta* L., а также *A. cinerea* L. въ большемъ противъ обыкновеннаго количествѣ, *Ciconia nigra* L. и нѣкоторыхъ другихъ, безъ сомнѣнія, можетъ быть объяснено этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ.

Будучи знакомъ съ мѣстностью не одинъ годъ и составивъ себѣ, поэтому, нѣкоторое понятіе о томъ, какъ часто встрѣчается та или другая птица, я нерѣдко затруднялся передать это подходящимъ терминомъ, смыслъ же употребленныхъ приблизительно слѣдующій:

*Очень, самый обыкновенный видъ*—говорю про тѣхъ, которыхъ видишь и наблюдаешь постоянно (*Passer domesticus*, *Hirundo rustica*, *Ch. urbica*, *Corvus cornix* и пр.)

*Обыкновенный*—о тѣхъ, которыхъ всегда можно добыть, которые могутъ составить предметъ опредѣленной охоты (*Anas*, *Sc. gallinago*, *Motacilla*, *Picus major*).

Если для добычи какого-либо вида нужно было приложить трудъ и не всегда, притомъ съ успѣхомъ, я говорю о нихъ: *довольно обыкновенный, довольно часто, нерѣдко* (сохраняя градацію этимологическаго смысла). *Довольно рѣдко*—если за все лѣто, весь годъ птица попадаетъ въ руки лишь нѣсколько разъ. *Встрѣчается*—когда имѣлись единичные экземпляры, большею частью отъ г. Геллерта.

Что касается литературы, то относительно области Ильменя ея нѣтъ. Въ Боровичскомъ уѣздѣ работалъ В. Хлѣбниковъ и сообщилъ мнѣ свои результаты, но воспользоваться ими я не могъ: новаго его перечень не представлялъ, біологическія же данныя, вслѣдствіе различія мѣстностей, только имъ и могутъ быть обработаны. Приходилось имѣть въ виду труды по сосѣднимъ губерніямъ, которыхъ списокъ привожу ниже.



Единственнымъ пособіемъ была коллекція г. Геллерта, которую онъ обязательно мнѣ предоставилъ. Къ сожалѣнію, я не могъ вполнѣ ею воспользоваться: собирая ее для набивки чучелъ въ ученическія и частныя коллекціи, онъ за недостаткомъ времени, часто не обозначалъ времени и мѣста добычи: такіе экземпляры, не смотря на ихъ интересъ, должны были быть оставлены, какъ матеріаль, и только несомнѣнно въ обл. Ильменя добытые внесены (каждый разъ съ оговоркой) въ списокъ. Считаю долгомъ благодарить Николая Егоровича Геллерта за его любезную помощь.

### 1. *Haliaëtus albicilla* L.

На Ильменѣ бѣлохвостикъ не рѣдкость: подъ осень его приходится наблюдать почти каждую охоту. Держится по озеркамъ, богатымъ утками, и едва-ли не предпочителнѣе у «заколовъ», гдѣ находитъ обильную пищу въ рыбѣ, толкущейся о дранки. Мѣстные охотники не пропускаютъ случая свалить этого хищника, перѣдко съ цѣлью добыть его жиру, которому приписываютъ цѣлебную силу. Находящійся въ коллекціи экземпляръ убитъ въ то время, когда онъ бросился на чучела, выставленные для приманки утокъ. (Малыя Аркажскія озера, <sup>27</sup>/VII). Что касается гнѣздованія, то, вообще говоря, едва-ли топографическія условія рассматриваемой береговой полосы могутъ удовлетворить привычкѣ этой птицы; мнѣ передавали о найденномъ близъ Бѣлой горы гнѣздѣ, но проверить эту находку не удалось.

### 2. *Pandion haliaëtus* L.

Не рѣдка; для коллекціи не удалось добыть, шкурки имѣются отъ г. Геллерта. <sup>17</sup>/VI 81, <sup>31</sup>/IV 8...

### 3. *Falco peregrinus* Briss.

Въ коллекціи г. Геллерта находится нѣсколько экземпляровъ безъ обозначенія, къ сожалѣнію, времени добычи ихъ, но несомнѣнно изъ области Ильменя.



4. *Hypotriorchis subbuteo* Linn.

Добыто два экземпляра:  $^{27}/\text{vi}\sigma$  около Холыньи,  $^{22}/\text{vii}\sigma$  около Хутынского монастыря. Представляетъ не часто, но постоянно встрѣчающуюся птицу. Наблюдать приходилось и въ ближайшихъ окрестностяхъ.

5. *Hypotriorchis aesalon* Gm.

Судя по числу видѣнныхъ и добытыхъ въ 1882 г. экземпляровъ, слѣдуетъ заключить, что встрѣчается чаще предыдущаго, но есть-ли это явленіе постоянное—сказать не могу. Въ прежніе годы наблюдался, во всякомъ случаѣ, не рѣже *H. subbuteo*.  $^{25}/\text{vii}\sigma$  Кислая Лужа,  $^{30}/\text{viii}\sigma$ —близъ Лопани,  $^3/\text{viii}\sigma$  Аркажскія озера,  $^{20}/\text{viii}\sigma$  (?) Взадъ. (Всѣ въ 1882 г.).

6. *Erythropus vespertinus* Linn.

Принадлежитъ къ числу довольно обыкновенныхъ птицъ.  $82^{31}/\text{vii}\sigma$  juv. добытъ близъ Лопани.

7. *Astur palumbarius* (Linn.).

Наблюдать приходится не очень часто. На Метѣ  $^{12}/\text{viii}$  добытъ juv. Гнѣздуется.

8. *Astur nisus* Linn.

Гораздо чаще предыдущаго. Это обыкновенный хищникъ не только ближайшихъ окрестностей, но залетающій очень часто въ сады, огороды, птичьи дворы города.  $82^{31}/\text{viii}\sigma$  Мала Аркажскія озера.

9. *Buteo vulpinus* Licht.

Не рѣдокъ во время осенняго пролета.

10. *Archibuteo lagopus* (Gmel.)

Поздней осенью 1874 г. былъ убитъ въ окрестностяхъ Новгорода (около Саввинскаго лѣса). Г. Геллертъ добывалъ, не однажды изъ обл. Ильмена.



11. *Pernis apivorus* (Linn.)

Довольно рѣдка.

12. *Milvus ater* (Gmel.)

Добытъ былъ одинъ экземпляръ (<sup>28</sup>/vii ♂, 82 г. за Юрьевскимъ скитомъ). Мѣстные охотники не разъ приносили эту птицу г. Геллерту.

13. *Circus aeruginosus* (Linn.)

Громадная площадь болотистой мѣстности даетъ обильную пищу этому луню, и вотъ вѣроятная причина почему по числу недѣлимыхъ онъ положительно превосходитъ всѣхъ хищниковъ разсматриваемой мѣстности. Его приходилось наблюдать каждую, безъ исключенія, охоту. Распластавъ крылья, носится онъ цѣлыми часами надъ болотомъ или лугами, хватая лягушекъ, насѣкомыхъ, мышей. Только испуганный чѣмъ либо подымается въ вышину, гдѣ рѣдко долго остается.

Въ 1882 г. ихъ было особенно много, и охотники брались добыть любое количество этого луня, съ платою за пару 20—30 копѣекъ.

<sup>16</sup>/vii ♂ за Алпатовымъ (на лугу) <sup>3</sup>/viii ♂ близъ Гнильнаго (болота) <sup>14</sup>/viii? тамъ же. (Въ 1882 г.)

14. *Circus cyaneus* (Linn.)

Хотя въ коллекціи находится только одинъ экземпляръ (<sup>3</sup>/viii ♂ Малыя Аркажскія озера), но это едва ли говоритъ въ пользу того, что *C. cyaneus* здѣсь рѣдокъ. Имѣя болѣе десятка шкуръ этого рода ближе не опредѣленныхъ на мѣстѣ и сберегая время, я много экземпляровъ оставилъ неснятыми, а въ числѣ ихъ, вѣроятно, *C. cyaneus*.

15. *Strigiceps pallidus* Sykes.

Добыто три экземпляра; 82 <sup>28</sup>/vii ♂, <sup>5</sup>/viii? близъ Гнильна, 82 <sup>20</sup>/viii ♂ (?) на Взвздѣ. Странно, что въ желудкѣ двухъ изъ нихъ найдены остатки повидимому *Totanus glottis*.

16. *Circus cineraceus* (Mont.)

82 <sup>14</sup>/viii ♀ (?) и <sup>21</sup>/viii ♂ оба убиты подъ Хутынью, гдѣ мѣстность не такъ низка и болотиста. Въ желудкѣ найдены мыши.

17. *Nyctea scandiaca* (Linn.)

Въ 1881 г. <sup>13</sup>/ii убита за озеромъ и находится въ коллекціи г. Геллерта.

18. *Syrnium lapponicum* (Sparm.).

<sup>3</sup>/iv84 мѣстный охотникъ убилъ у гнѣзда ♂ и ♀. Въ гнѣздѣ, по его словамъ, были яйца. Одинъ экземпляръ находится у меня, другой у г. Геллерта.

19. *Nyctale Tengmalmi* (Gmel.).

Рѣдка. Знаю не болѣе двухъ-трехъ случаевъ ея добычи. У г. Геллерта есть шкурки, но время не записано.

20. *Glaucidium passerinum* (Linn.).

Жила нѣкоторое время въ клѣткѣ. Довольно рѣдка.

21. *Bubo ignavus* Forst.

Держится въ глухихъ лѣсахъ. Охотники убиваютъ каждую зиму. Въ 1874 г. былъ убитъ въ то время, какъ доѣдалъ *Brachyotus palustris*.

22. *Surnia nisoria* Meyer.

Не рѣдка. <sup>21</sup>/x81.

23. *Otus vulgaris* Flem.

У г. Геллерта есть нѣсколько шкуръ этого вида. <sup>17</sup>/iv83 добытъ пуховой.

24. *Otus brachyotus* L.

Изъ почныхъ хищниковъ самый обыкновенный. Онъ соотвѣтствуетъ въ этомъ отношеніи *Circus aeruginosus*. Въ нѣко-



торые годы ихъ являлось особенно много, напр. въ 1876 г. одинъ охотникъ носилъ мнѣ подъ осень чуть-ли не ежедневно 2—3, и все изъ одной и той же мѣстности.

<sup>18</sup>/vii82 ♂ подъ Хутынью; <sup>26</sup>/vii ♀ и <sup>21</sup>/viii82 тамъ же.

## 25. *Syrnium aluco* L.

Въ прежніе годы не разъ приносили охотники и притомъ обѣ цвѣтоты разновидности.

## 26. *Syrnium uralense* Pall.

Въ концѣ семидесятыхъ годовъ два экземпляра держались въ городскомъ общественномъ саду, гдѣ одинъ убитъ (шкурка у меня), а другой, какъ передавалъ г. Геллертъ, найденъ забившимся въ слуховое окно избушки и замерзшимъ. Страннымъ кажется послѣдній фактъ, — неужели онъ не могъ себя прокормить или просто не былъ въ силахъ выбраться?

## 27. *Caprimulgus europæus* Linn.

Довольно обыкновененъ; несомнѣнно гнѣздуетъ. <sup>21</sup>/vi82 ♀ около Мшашки. <sup>20</sup>/vi ♂ и <sup>21</sup>/viii82 ♀ около Хутины.

## 28. *Cypselus apus* (Linn).

Очень обыкновененъ; гнѣздуетъ. <sup>15</sup>/vi82 ♂.

## 29. *Hirundo rustica* L.

Очень обыкновенна. Гнѣздуетъ по деревнямъ и въ строенияхъ ближайшихъ окрестностей.

## 30. *Chelidon urbica* Linn.

Очень обыкновенна; гнѣздуетъ.

## 31. *Cotyle riparia* Linn.

Массаи роетъ гнѣзда въ крутыхъ берегахъ мѣстныхъ рѣчекъ, на Сиверсовомъ каналѣ, Грибѣ, Перервѣ и пр.



32. *Certhia familiaris* Linn.

Встрѣчается.

33. *Sitta europea* Linn.

Добыто два экземпляра: <sup>6</sup>/viii и <sup>15</sup>/viii82, оба самцы;  
Мшашка.

34. *Sitta uralensis* Licht.

<sup>15</sup>/viii82 убитъ на Мшашкѣ.

35. *Parus major* Linn.

Два экземпляра съ Мшашки <sup>15</sup>/viii82; изъ Саввинскаго  
лѣса тогда же.

36. *Parus borealis* Selys.

<sup>15</sup>/viii82 ♂ Мшашка; <sup>12</sup>/ix81. Не рѣдка.

37. *Parus coeruleus* Linn.

Мшашка <sup>15</sup>/viii82.

38. *Parus cyaneus* Pall.

Не разъ приходилось добывать въ прежніе годы.

39. *Parus caudatus* Linn.

Въ коллекціи г. Геллерта <sup>30</sup>/ix81.

40. *Bombycilla garrula* Linn.

Осенью.

41. *Garrulus glandarius* Linn.

Довольно обыкновенна. 82<sup>15</sup>/viii ♂ Мшашка. <sup>27</sup>/ix и <sup>25</sup>/x81.

42. *Garrulus infaustus* Linn.

<sup>3</sup>/viii79 (коллекція г. Геллерта).



43. *Pica caudata* Ray.

Лѣтомъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Новгорода довольно рѣдка, подъ осень—чаще, но далеко не въ большомъ количествѣ; <sup>26</sup>/VII 82 ♂, Грибъ.

44. *Corvus corax* Linn.

Гнѣздуетъ. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ одинъ изъ товарищей досталъ пять яицъ изъ гнѣзда, свитаго подъ крышей Кремлевской башни, находящейся въ чертѣ Лѣтняго сада. Другое гнѣздо было въ Чертовой башнѣ, гдѣ существуетъ, вѣроятно, до сихъ поръ. Въ 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> верстахъ отъ города находится бойня, построенная на довольно высокихъ сваяхъ. Прямо подъ нее стекаетъ кровь и выбрасываются другіе остатки. Вотъ здѣсь то раннимъ утромъ можно наблюдать стаю кормящихся воронъ, галокъ и двухъ, трехъ, иногда больше, вороновъ между ними. Тутъ-же расхаживаетъ до десятка бездомныхъ собакъ. Начинаясь съ наступленіемъ дня ѣзда и ходьба разгоняетъ эту компанію. Иногда приходится ихъ видѣть у заколовъ, гдѣ лакомятся успувшей рыбой. Попадались экземпляры съ бѣлыми пятнами.

45. *Corvus cornix* Linn.

Гнѣздуетъ и въ городѣ, и за городомъ.

46. *Corvus frugilegus* Linn.

Масса гнѣздъ въ рощахъ Антоніева монастыря и Юрьевского скита.

47. *Corvus monedula* Linn.

Очень много гнѣздъ по колокольнямъ, церквямъ, въ стѣнахъ Кремля и проч.

48. *Oriolus galbula* Linn.

Не рѣдка: гнѣздуетъ.



49. *Sturnus vulgaris* Linn.

Гнѣздуесть въ дуплахъ окрестныхъ рощъ и очень многочисленныхъ скворечницахъ въ самомъ городѣ. Осенью огромныя стаи, кормящіяся, большею частью, среди скота. Моему товарищу приходилось наблюдать, какъ при выстрѣлѣ по стаѣ падали совершенно здоровые потомъ улетавшіе скворцы.

Такой фактъ лучше всего объясняется ихъ склонностью къ подражанію.

50. *Lanius collurio* Linn.

Не рѣдокъ, гнѣздуесть. 82<sup>15</sup>/vii ♂ ближайшія окрестности; 18/viii 82 ♀ подъ Хутиною; 13/viii 82 берегъ Мсты.

51. *Turdus iliacus* Linn.

Не рѣдокъ.

52. *Turdus musicus* Linn.

Не рѣдокъ.

53. *Turdus pilaris* Linn.

10/vi 82 и 22/vi 82 около Мшашки добыты молодые. Не рѣдокъ.

54. *Butalis grisola* Linn.

Встрѣчается.

55. *Muscicapa atricapilla* Linn.

Въ коллекціи г. Геллерта.

56. *Saxicola oenanthe* Linn.

21/viii 82 ♂ ближайшія окрестности.

57. *Pratincola rubetra* Linn.

Обыкновенна. 16/vii 82 два ♂ за Алпатовымъ, 15/viii 82 ♂ на Мшашкѣ, 19/viii 82 ♂ на Красномъ Полѣ.

58. *Ruticilla phaenicura* Linn.

24/viii 84 окрестности Новгорода.



59. *Erythacus rubecula* Linn.

Гнѣздуеть. <sup>15</sup>/viii82 два экземп. на Мшаишкѣ.

60. *Daulias philomela* (Bechst.)

<sup>21</sup>/vi82 juv. <sup>10</sup>/v81, <sup>22</sup>/viii81 — окрестности города.

61. *Sylvia atricapilla* Linn.

Въ коллекціи г. Геллерта.

62. *Sylvia hortensis* Bechst.

Встрѣчается.

63. *Regulus cristatus* Koch.

Встрѣчается.

64. *Phyllopneuste rufa* Lath.

Встрѣчается.

65. *Phyllopneuste trochilus* Linn.

Встрѣчается.

66. *Phyllopneuste sibilatrix* Br.

Встрѣчается.

67. *Calamodyta phragmitis* Bechst.

Держится во всѣхъ кустахъ, покрывающихъ берега рѣчекъ и площади между ними. Обыкновенна. <sup>14</sup>/vii82 три ♂ и ♀ Красное Поле; <sup>21</sup>/vii82 ♂ ближайшія окрестности.

68. *Motacilla alba* Linn.

Обыкновенна; гнѣздуеть. <sup>20</sup>/vii82 ♂ ♂ подъ Кунинымъ.

69. *Motacilla flava* Linn.

Въ коллекціи Геллерта <sup>24</sup>/iv81.



70. *Motacilla viridis* Gmel.

Обыкновенна. <sup>10</sup>/vi82 ♂ Мшашка.

71. *Ficedula hypoleis* Linn.

<sup>20</sup>/vii82 ♂ — ближайшія окрестности, <sup>21</sup>/vii82 ♂, <sup>13</sup>/viii82 ♂ Мста.

72. *Anthus pratensis* Linn.

Добыто 4 экземпляра: <sup>11</sup>/vii82 два ♂ — ближайшія окрестности; 82<sup>13</sup>/viii ♂ на Мстѣ, 82<sup>16</sup>/viii — близъ Волотова.

73. *Anthus trivialis* (Linn.).

Не рѣдокъ; <sup>5</sup>/vii81 (колл. г. Геллерта).

74. *Alauda arvensis* Linn.

Гнѣздуется; оч. обыкновененъ; <sup>21</sup>/vi82 ♂; <sup>1</sup>/vii82 ♂ около Новгорода.

75. *Alauda arborea* Linn.

Въ коллекціи г. Геллерта <sup>14</sup>/vi82.

76. *Galerita cristata* (Linn.).

Мнѣ извѣстенъ только одинъ случай добычи *G. cristata* въ области Ильменя. Экземпляръ, безъ обозначенія времени добычи, у г. Геллерта.

77. *Loxia curvirostra* Linn.

Не рѣдокъ.

78. *Emberiza citrinella* Linn.

Не рѣдка; <sup>18</sup>/vii82 ♂ и ♀ подъ Хутынью.

79. *Passer domesticus* (Linn.).

Всюду оч. обыкновененъ.

82758  
493758



80. *Passer montanus* (Linn.).

Оч. обыкновененъ въ ближайшихъ окрестностяхъ. Подъ осень въ стаяхъ вмѣстѣ съ *P. domesticus* на поляхъ овса.

81. *Fringilla coelebs* Linn.

Нерѣдокъ. Въ Саввинскомъ лѣсу его гнѣзда находятъ довольно часто. <sup>20</sup>/VII<sub>9</sub> ближайш. окрест.

82. *Fringilla montifringilla* Linn.

Встрѣчается.

83. *Linota cannabina* (Linn.)

Гнѣздуетъ, не рѣдокъ; <sup>13</sup>/IX81.

84. *Linota linaria* Linn.

Осенью чечетки налетаютъ въ сады города довольно значительными стайками, и ловить ихъ тогда не трудно: выставивъ западню о четырехъ заполахъ, можно дожидаться, какъ въ каждую изъ нихъ будетъ поймана чечетка: бьющіяся пойманныя не пугаютъ налетающихъ. Ручнѣютъ онѣ чрезвычайно скоро: пройдетъ день, другой и невольница освоилась съ клѣткой. Но въ то-же время выживаютъ не долго и какъ-то внезапно мрутъ: совершенно здоровая, веселая, охотно кормившаяся чечетка падаетъ мертвой безъ всякой видимой причины.

85. *Carduelis elegans* Steph.

Встрѣчается.

86. *Chrysomitris spinus* (Linn.).

Не рѣдокъ. Осенью много ловятъ по садамъ, гдѣ появляется съ половины августа. 81<sup>30</sup>/IX ♂.

87. *Carpodacus erythrinus* (Pall.).

Встрѣчается.



88. *Pyrrhula vulgaris* Pall.

Обыкновененъ; зимой въ Саввинѣ стайками вмѣстѣ съ воробьями. 82<sup>15</sup>/viii Мшашка.

89. *Pinicola enucleator* (Linn.).

Одну зиму я имѣлъ много щуровъ, добытыхъ въ Саввинскомъ лѣсу.

90. *Jynx torquilla* Linn.

Встрѣчается.

91. *Dryocopus Martius* (Linn.).

82<sup>22</sup>/viii ♂ въ Саввинскомъ лѣсу. Не часто удается наблюдать, между тѣмъ какъ въ другихъ частяхъ Новгородской губ. (Вишера), какъ передавали, обыкновененъ.

92. *Picus major* Linn.

Довольно обыкновененъ; осенью приближается къ городу, залетаетъ въ сады.

93. *Picus leuconotus* Bechst.

Добытъ <sup>16</sup>/v82 за Антоніевой рощей.

94. *Picus minor* Linn.

Встрѣчается.

95. *Picus tridactylus* (Linn.).

<sup>25</sup>/vi84, <sup>8</sup>/xi область Ильменя. По показанію г. Геллерта гнѣздуется.

96. *Gecinus viridis* (Linn.).

Не часто.

97. *Gecinus canus* (Gmel.).

<sup>5</sup>/viii82 ♂ въ Саввинскомъ лѣсу.



98. *Cuculus canorus* Linn.

Довольно обыкновенна. <sup>27</sup>/vi82 ♂, <sup>20</sup>/vii82 ♂ Печерское озерко (экземпляръ ржаво-краснаго цвѣта), <sup>21</sup>/vii82 ♂ Сиверсовъ каналъ.

99. *Columba livia* Bechst.

Какъ и во всѣхъ городахъ и селахъ. Подъ осень большія стаи на ржаныхъ поляхъ окрестностей, часто довольно отдаленныхъ отъ жилья.

100. *Tetrastes bonasia* Linn.

Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Новгородской губерніи это еще обильно встрѣчающаяся дичь, составляющая предметъ промысла. Въ часто посѣщаемомъ Саввинскомъ лѣсу, откуда добытъ <sup>6</sup>/viii82 juv., довольно рѣдокъ, хотя лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ встрѣчался гораздо чаще.

101. *Tetrao urogallus* Linn.

Въ болѣе глухихъ мѣстахъ (Вошище и проч.). Гнѣздуетъ.

102. *Tetrao tetrix* Linn.

Также въ болѣе глухихъ мѣстахъ. Гнѣздуетъ.

103. *Perdix cinerea* Lath.

Довольно обыкновенна.

104. *Lagopus albus* (Gmel.).

Довольно обыкновенна.

105. *Coturnix dactylosonans* Meyer.

Добыто 6 экземпляровъ, большею частью, изъ мало отдаленныхъ окрестностей. За послѣдніе годы перепелка стала попадаться, повидимому, гораздо чаще. <sup>9</sup>/vi82 ♂ и <sup>27</sup>/vi82 ♂ около Холыни, <sup>12</sup>/vii82 ♂ около Неглицкаго озера, <sup>23</sup>/vii82 ♂ подъ Кунинымъ, <sup>24</sup>/vii82 ♂ и ♂ около Малаго Волховца.



106. *Ortygometra porzana* Linn.

Обыкновенна. <sup>14</sup>/VI82 убита самка съ готовымъ къ снесенію и 6 недоразвитыми яйцами. Молодыхъ часто ловить собака.

107. *Crex pratensis* Bechst.

Очень обыкновенная гнѣздящая птица.

108. *Gallinula chloropus* (Linn.).

<sup>3</sup>/VIII82 добытъ зимой. Въ коллекціи г. Геллерта найденъ пуховой, который переданъ въ кабинетъ университета.

109. *Rallus aquaticus* Linn.

Въ 80 или 81 г. убитъ въ началѣ лѣта и находится въ коллекціи г. Геллерта.

110. *Fulica atra* Linn.

Гнѣздуетъ, не рѣдка. <sup>14</sup>/VI82 мѣстный охотникъ добылъ мнѣ въ Глухихъ Донцахъ двухъ молодыхъ и двухъ старыхъ (♂ и ♀). Также <sup>24</sup>/VI и <sup>27</sup>/VI82 добыты молодые. Въ 1882 г. ихъ было, повидимому, больше, чѣмъ обыкновенно.

111. *Grus cinerea* Bechst.

Гнѣздуетъ.

112. *Squatarola helvetica* (Linn).

<sup>27</sup>/V81. Не рѣдка.

113. *Aegialites curonicus* Besek.

<sup>17</sup>/VII82 ♀ на Мстѣ, <sup>21</sup>/VI82 ♂ близъ Лопани, <sup>13</sup>/VIII82 два ♂ на Мстѣ. Не рѣдокъ.

114. *Charadrius pluvialis* Linn.

Встрѣчается.



115. *Vanellus vulgaris* Bechst.

Не рѣдка, гнѣздуетъ. <sup>18</sup>/v 82 добыты пуховые около Коростыни; <sup>27</sup>/vi 82 ♂ около Холыны.

116. *Haematopus ostralegus* Linn.

Не часто. <sup>22</sup>/viii 80.

117. *Phalaropus angustirostris* Naum.

Встрѣчается.

118. *Totanus glareola* Linn.

Не рѣдокъ; <sup>14</sup>/vi 82 ♀ Кислая Лужа; <sup>4</sup>/viii 82 ♂ Малая Аркажскія озера.

119. *Totanus ochropus* Linn.

<sup>24</sup>/vi 82 ♂, <sup>28</sup>/vi 82 ♂ около Большой Глинки; <sup>24</sup>/vi 82 ♂ Кислая Лужа; <sup>14</sup>/viii 82 ♂ на Тарасовцѣ. Обыкновененъ. Нѣкоторые экземпляры имѣли кишечныхъ глисть.

120. *Totanus fuscus* (Linn.)

Также обыкновененъ, но уступаетъ въ этомъ отношеніи *T. glottis*; <sup>21</sup>/viii 82 ♂ Малая Глинка; <sup>4</sup>/viii 82 два ♂ Малая Аркажскія озера.

121. *Totanus glottis* Linn.

Обыкновененъ по берегамъ всѣхъ озеръ и рѣчекъ. <sup>28</sup>/vi 82 ♂ — Большая Глинка, <sup>25</sup>/viii 82. — Опархино.

122. *Actitis hypoleucos* (Linn.)

Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ куличекъ, котораго мѣстные охотники почему-то прозвали «Семень Семенычемъ», гнѣздуетъ въ области Ильменя. Обыкновененъ. Подъ осень собирается въ небольшія стайки, которыя подъ вечеръ и по утрамъ носятъ съ одного берега Волхова на другой даже въ чертѣ города.



123. *Limosa rufa* Linn.

Встрѣчается.

124. *Limosa aegoccephala* (Linn.)

Одинъ экземпляръ изъ области Ильменя находится у г. Геллерта, безъ обозначенія времени добычи.

125. *Machetes pugnaх* (Linn.)

Обыкновененъ. Добыто до 11 экземпляровъ; въ весеннемъ нарядѣ попадались еще въ концѣ іюня. Въ числѣ добытыхъ одинъ juv. съ оставшимся въ незначительной степени пухомъ на головѣ. Осенью собираются на Ильменѣ въ огромныя стаи и становятся очень сторожки. Въ 82 году: <sup>7</sup>/iv ♂ Аркажскія озера, <sup>13</sup>/vi ♂ Большая Глинка, <sup>14</sup>/vi ♂ ♂ Кислая Луза, <sup>31</sup>/vi ♂ ♂ устье Мсты, <sup>18</sup>/vii ♀ подъ Хутыню, <sup>25</sup>/vi juv. Кислая Луза.

126. *Tringa minuta* Leisl.

Не рѣдка. <sup>3</sup>/ix 81, <sup>16</sup>/viii 82 (4 экземпляра).

127. *Tringa subarquata* (Güld).

Не рѣдокъ; добытъ ♂ <sup>20</sup>/viii 82 на Взвадѣ.

128. *Tringa alpina* Linn.

♂ и ♀ <sup>28</sup>/vii 82; у ♂ въ кишкахъ глисты.

129. *Scolopax gallinula* Linn.

Гаршнепъ далеко не обильно встрѣчающаяся птица. Могу указать только одно мѣсто, гдѣ, по словамъ охотниковъ, онъ держится болѣе или менѣе постоянно: это озеро Мячино, за Троицкой слободой; одинъ экземпляръ <sup>19</sup>/vii 82 купленъ на рынкѣ, другой ♂ <sup>15</sup>/vii 82 убитъ около Хутыни. Въ коллекціи г. Геллерта оказались два молодыхъ экзempl. съ еще не сошедшимъ съ головы и горла пухомъ, добытые <sup>26</sup>/vi и <sup>28</sup>/vi 82, чѣмъ устанавливается фактъ гнѣздованія *S. gallinula* въ разсматриваемой области,



130. *Scolapax gallinago* Linn.

Бекасъ представляетъ всюду обыкновенную, гнѣздящую, промысловую птицу. Было время, когда, выйдя за городъ, на такъ называемомъ Красномъ Полѣ, можно было найти не одну пару, а съ Взада за 2 — 3 дня охоты привозили «кошель» бекасовъ. Теперь уже далеко нѣтъ такого обилія, хотя для охотниковъ-промышленниковъ онъ не перестаетъ составлять главной добычи. Въ 1882 г. ихъ было особенно мало, что, конечно, стоитъ въ зависимости отъ сухаго лѣта, затруднившего до-нельзя охоту. <sup>16</sup>/vii 82 добыты пуховые.

131. *Scolapax major* Gm.

Менѣе многочисленъ, чѣмъ бекасъ. На Красномъ Полѣ (тотчасъ за городомъ) постоянно держится пара—другая. Въ послѣдніе годы быстро бѣднѣетъ числомъ. Не разъ были находимы гнѣзда.

132. *Scolapax rusticola* Linn.

Я никогда не слышалъ, чтобъ число добываемыхъ вальдшнеповъ было значительно.

133. *Numenius arquata* (Linn.)

Гнѣздуетъ. Далеко не обильно встрѣчающаяся птица. <sup>17</sup>/v 81.

134. *Numenius phaeopus* (Linn.)

Попадаетъ не часто. Никогда не приходилось слышать о найденныхъ гнѣздахъ или добытыхъ молодыхъ.

135. *Ardea cinerea* Linn.

Добыты juv. и ♂ <sup>20</sup>/viii 82. Не рѣдка, а въ 1882 г. ихъ было довольно много.

136. *Ardea minuta* (Linn.)

Добыто 7 экземпляровъ: ♂ <sup>24</sup>/vi 82 около Глухихъ Донцевъ, ♀ <sup>27</sup>/vi 82 около Холыньи, ♂ <sup>30</sup>/vi 82 у устья Мсты, ♂ <sup>16</sup>/vii 82—



тамъ же, ♂ <sup>17</sup>/vii 82—тамъ же; juv. ♂ <sup>20</sup>/vii 82—Глухіе Донцы и ♀ <sup>21</sup>/vii 82 на рѣчкѣ Маломъ Грибѣ. Появленіе этой птицы въ бассейнѣ Ильменя совершенно обусловливается, какъ кажется, тѣми причинами, о которыхъ я упоминалъ не разъ—обиліемъ пищи, легкостью ея добычи. До 1882 г. о выпкѣ, какъ назвали его мѣстные охотники, почти ничего не знали, многіе никогда его не видѣли; поэтому, если онъ и держался здѣсь, то въ очень незначительномъ числѣ. Съ 1874 по 1881 ни мнѣ, ни г. Геллерту его ни разу не приносили, хотя охотились въ тѣхъ же мѣстахъ, откуда въ 1882 г. добыли до 25 экземпляровъ. Въ числѣ добытыхъ мною есть одинъ ♂ juv., но говоритъ ли это въ пользу гнѣздованія—рѣшить не берусь. У всѣхъ въ зобу была находима рыба, преимущественно щучки, иногда довольно большія для такой птицы (13 сант.); вромѣ рыбы у большинства—гладыши (*Notonecta glauca*), у одной 13 штукъ. Держалась *A. minuta* въ кустахъ около воды, у заколовъ по небольшимъ рѣчкамъ.

### 137. *Ciconia nigra* (Linn.)

<sup>19</sup>/viii 82 убитъ на Взвадѣ, на стойкѣ (летѣло 12 штукъ). Довольно рѣдокъ на Ильменѣ. Зобъ убитаго былъ переполненъ рыбой.

### 138. *Ciconia alba* Bechst.

По сообщенію г. Геллерта добытъ <sup>5</sup>/vi 83.

### 139. *Botaurus stellaris* (Linn.).

Обыкновенна, а въ 1882 г. ихъ было много. ♀ <sup>23</sup>/vi 82, убитая подъ Кунинымъ, имѣла насидивательное пятно.

### 140. *Anser cinereus* Meyer.

### 141. *Anser arvensis* Naum.

### 142. *Anser segetum* Naum.

Всѣ три вида во время пролета.

### 143. *Cygnus musicus* Bechst.

Осенью и весной на пролетѣ. <sup>4</sup>/v 83.



144. *Anas boschas* Linn.

Обыкновенна, гнѣздуеть. <sup>28</sup>/VI 82 ♂ Большая Глинка.

145. *Chaulelasmus streperus* (Linn.)

У Бихнера («Птицы С.-Петербургской губ.» Спб. 1884 стр. 519) находимъ свѣдѣнія, что была добыта въ апрѣлѣ 1882 г. въ Новгородской губ.

146. *Anas clupearata* Linn.

Гнѣздуеть, не рѣдка; <sup>14</sup>/VI 82 въ Глухихъ Донцахъ добыто 4 утенка этого вида и двѣ самки.

*Anas marmorata* Temm.

Въ коллекціи г. Геллерта находится экземпляръ, добытый, по его словамъ, въ области Ильменя <sup>24</sup>/V 81, — фактъ настолько неожиданный, что внести этотъ видъ въ общій счетъ — я не рѣшился.

147. *Querquedula crecca* (Linn.)

Обыкновененъ, гнѣздуеть. <sup>14</sup>/VI 82 juv. Глухіе Донцы, <sup>19</sup>/VIII ♀ Красное Поле.

148. *Anas querquedula* Linn.

Обыкновененъ, гнѣздуеть. <sup>4</sup>/VI 82 juv. <sup>10</sup>/VI 82 juv 82 <sup>14</sup>/VI пуховикъ.

149. *Dafila acuta* (Linn.)

Не рѣдка.

150. *Mareca penelope* (Linn.)

Не рѣдка.

151. *Fuligula marila* (Linn.)

81 <sup>7</sup> и <sup>17</sup>/V ♀ ♂

152. *Fuligula cristata* (Leach.)

<sup>14</sup>/VI 81, <sup>7</sup>/V 81 ♂ пойманъ въ мережи.



153. *Glaucion clangula* Linn.

<sup>23</sup>/VI 82 ♂ и ♀ изъ Аркажскихъ озерокъ; <sup>16</sup>/IV 83 ♀. Не рѣдокъ.

154. *Oidemia nigra* Linn.

Довольно рѣдка. Мнѣ извѣстны 3—4 случая ея добычи.

155. *Mergus serrator* Linn.

<sup>21</sup>/IX 83. Не часто.

156. *Mergus albellus* Linn.

<sup>4</sup>/VIII 82 убитъ въ Аркажскихъ озеркахъ.

157. *Larus canus* Linn.

Обыкновенна, гнѣздуеть. <sup>31</sup>/VI 81, <sup>7</sup>/VIII 81, <sup>16</sup>/X 81.

158. *Larus minutus* Pall.

Встрѣчается довольно часто. Въ 81 году: <sup>4</sup>/VI, <sup>24</sup>/VI, <sup>8</sup>/VII, <sup>9</sup>/VIII, <sup>17</sup>/VII.

159. *Larus ridibundus* Linn.

Встрѣчается не рѣдко. <sup>16</sup>/X 81.

160. *Sterna hirundo* Linn.

Очень обыкновенна; добыты яйца, пуховые и молодые <sup>9</sup>/VI 82 ♂ ♂ и ♀ Большая Глинка, <sup>27</sup>/VI пухов. <sup>27</sup>/VII juv. <sup>25</sup>/VII ♀ Кислая Лука, <sup>31</sup>/VII juv. близъ Лопани (всѣ въ 1882 г.).

161. *Sterna nigra* Linn.

Встрѣчается далеко не въ такомъ числѣ, какъ предыдущая. Гнѣздуеть. <sup>9</sup>/VI ♂ и ♀—Большая Глинка, <sup>28</sup>/VI, <sup>30</sup>/VI juv. устье Мсты, <sup>28</sup>/VIII — (всѣ въ 1882 г.)

162. *Sterna leucoptera* Pall.

<sup>28</sup>/VI 82 около Большой Глилки былъ убитъ ♂.

Второй экземпляръ изъ области Ильменя, безъ обозначенія времени добычи, у г. Геллерта. Быть можетъ, жаркое лѣто прямая причина такого сѣвернаго залета *S. leucoptera*.



163. *Lestris parasitica* Linn.

<sup>2</sup>/х 82. Нѣсколько экземпляровъ въ коллекціи г. Геллерта.

164. *Lestris pomarinus* Temm.

<sup>2</sup>/хІ 79 — въ коллекціи г. Геллерта.

165. *Colymbus arcticus* Linn.

Не часто. <sup>14</sup>/VI 81 ♀.

166. *Colymbus septentrionalis* Linn.

<sup>1</sup>/VI 83 три экземпляра.

167. *Podiceps cristatus* (Linn.)

Обыкновенна, гнѣздуетъ; <sup>7</sup>/VI 82 добыты молодыя и ♀ въ Арважскихъ озерахъ.

168. *Podiceps subcristatus* (Jacq.)

Добыты въ области Ильменя <sup>12</sup>/VIII 83.

169. *Podiceps auritus* (Linn.)

<sup>23</sup>/IV 82 въ области Ильменя.

## Списокъ трудовъ, имѣвшихся въ виду:

*A. Mejacoff.* Catalogue des oiseaux observés dans le gouvernement de Vologda (Bulletin de la société imp. des natur. de Moscou, T. XXIX an. 1856, № IV).

*I. Порчинскій.* О фаунѣ позвоночныхъ Гдовскаго уѣзда Петерб. губ. (Труды С.-Петербургскаго Общ. Естеств. Т. III. 1872 стр. 371).

*В. Эсауловъ.* Списокъ позвоночныхъ животныхъ Холмскаго и Торопецкаго уѣзда Псковск. губ. (Зоологія, совмѣстн. изд. естествоисп. при русскихъ универ. за 1877—78 гг. т. III и IV).

*E. Büchner und T. Pleske.* Beiträge zur Ornithologie des St. Petersburger Gouvernem. (Отдѣльный оттискъ; въ трудахъ Академіи Наукъ за 1881 г.)